

冠状病毒与慢性病

额外的防护建议

患有高血压、糖尿病和其他慢性疾病的成年人可能更容易感染冠状病毒。我们都有责任阻止冠状病毒的蔓延，保护患者的健康。

对医护人员的建议

- ✓ 在医疗机构内对所有患者接诊收治的全程均需采取标准防护措施，包括设备消毒。
- ✓ 分诊和早期识别出现感冒和流感样症状的患者很重要。如果可能的话，请让他们在单独的区域候诊。
- ✓ 通过短信或电话联系您的高血压、糖尿病和其他非传染性疾病（慢性疾病）患者，远程回访并制定计划。



- ✓ 在受冠状病毒爆发影响的地区，除非患者出现疑似症状或其他紧急医疗需求，鼓励患者避开医疗机构以避免不必要的暴露。
- ✓ 处理出现感冒及流感样症状的患者，需采取呼吸道传染病防护措施，防止病毒传播。*
- ✓ 对于来院就诊且病情稳定的患者，尽量开长处方（90天为最佳）。



- ✓ 考虑在社区内为慢性疾病患者设立流动药房或配药点，且远离为其它疾病患者提供医疗服务的机构。



*[https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-\(ncov\)-infection-is-suspected-20200125](https://www.who.int/publications-detail/infection-prevention-and-control-during-health-care-when-novel-coronavirus-(ncov)-infection-is-suspected-20200125)

决心工程正在努力防止数百万人死于心血管疾病和流行病。欲了解更多信息，请访问www.resolvetosavelives.org和 www.preventepidemics.org

RESOLVE
TO SAVE LIVES
AN INITIATIVE OF VITAL STRATEGIES